

வெட்டுசார் குடலிறக்கம் INCISIONAL HERNIA

குடலிறக்கம் நம் உடம்பில் காணப்படும் குறைபாடுகளில் ஹெர்னிய (Hernia) எனப்படும் குடலிறக்கம் மிக முக்கியமானதாகும். ஆனால் குடலிறக்கத்தைப் பற்றி சரிவரத் தெரியாததால், இதனால் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டப் பின்னரே நிறையபேர் அறுவை சிகிச்சை செய்துக் கொள்வார்கள். இவற்றைப் பற்றி நாம் இங்கு இனி காணலாம்.

ஹெர்னியா (குடலிறக்கம்) என்றால் என்ன?

நமது வயிற்றுப் பகுதியில் உள்ள தசைநார்கள் பழுது அடைந்து இருந்தாலோ அல்லது பிறவியிலேயே தசை அடைந்து ஓட்டையுடன் இருந்தாலோ, வயிற்றின் உள் இருக்கும் குடல் இதன் வழியாக இறங்கி வெளிவருவதையே குடலிறக்கம் என்கிறோம்.

ஹெர்னியா ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் என்ன?

இதற்கு முக்கியமாக கீழ்க்கண்ட காரணங்களைக் கூறலாம்.

1.வயிற்றின் தசைநார்கள் பிறவியிலேயே பழுது அடைந்து இருப்பது.

2.வயிற்றினுள் அழுத்தம் அதிகமாக இருந்தால், உள்ளிருக்கும் குடலோ அல்லது குடலுடன் ஓட்டிய கொழுப்போ வெளியே வரும். இதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன.

(I)தொடர் இருமல் (Whooping Cough in children, Chronic Cough in TB Patients)

(II)சிறுநர் அடைப்பு வியாதிகள் (Prostate வீக்கம் மற்றும் சிறுநீர்ப்பாதை சுருக்கம்)

(III)மலச்சிக்கல்

(IV) அடிக்கடி குழந்தை பெறுதல்

(V)உடல் பருமன்

(VI)அதிகமான எடை மற்றும் பளு தூக்குதல்
ஹெர்னியா எந்த வயதில் வரும்?

ஹெர்னியா பிறந்த குழந்தை முதல் எந்த வயதினருக்கும் ஆண், பெண் வித்தியாசம் இல்லாமல் வரும். சிறுவர்களுக்கும், இளம்வயது ஆண்களுக்கும் அதிகளவு வரும்.

ஹெர்னியா எத்தனை வகைப்படும்?

ஹெர்னியா உடம்பில் வரும் இடத்தைப் பொருத்து பலவகைப்படும். இதில் Inguinal Hernia, Umbilical Hernia, Incisional Hernia, மற்றும் Femoral Hernia போன்றவை முக்கியமானவை.

Incisional Hernia (வெட்டுசார் குடலிறக்கம் என்றால் என்ன?)

வயிற்றில் ஒரு முறை செய்த அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு, பக்க தசைகள் பலவீனப்பட்டு தையல் விட்டுப் போனால் (உதாரணம்: சிசேரியன், கர்ப்பப்பை அகற்றுதல், குடல்வால் நீக்குதல், கேன்சர் ஆபரேசன்) ஹெர்னியா உருவாகும்.

Herina - வை மருந்தால் குணப்படுத்த முடியுமா?

ஹெர்னியாவை மருந்தால் குணப்படுத்த முடியாது. அதற்கு அறுவை சிகிச்சையே நிரந்தர தீர்வு. இதனை சாதாரண அறுவை சிகிச்சை (Open Method) முறையிலும், லேப்ராஸ்கோப்பி (Laparoscopic Method) அறுவை சிகிச்சை முறையிலும் செய்யலாம்.

ஹெர்னியாவால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்னென்ன?





● டாக்டர் ஆர். கண்ணன்

இரைப்பை, குடல் மற்றும் உடல்பருமன்
அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்

இருக்கும். ஒன்று, இரண்டு நாட்களிலேயே வீட்டிற்கு செல்லலாம். மேலும், நான்கு அல்லது ஐந்து நாட்களிலேயே நாம் அன்றாட வேலைகளை செய்ய இயலும்.

ஹெர்னியாவுக்கு ஆபரேசன் செய்தபிறகு நாம் மீண்டும் பழையமாதிரியே வேலை செய்ய முடியாது என்று கூறுகிறார்களே. அது உண்மையா?

இது முற்றிலும் தவறான கருத்தாகும். இந்த நவீன மருத்துவ உலகில் உள்ள புது புது முறைகளிலும், மேலும் தசைப்பகுதியை வலுவூட்டக் கூடிய பலவகைப்பட்ட Mesh- ஐ (Prolene, Bard, Vipro, Proceed, Parietex) வைத்து சரிசெய்யும் போதும், எந்த குறைபாடும் வராது. ஹெர்னியாவும் மீண்டும் வராது. நாம் எல்லா வகையான வேலைகளையும் (உதாரணம்: பளுதாக்குதல் மற்றும் கடுமையான உடற்பயிற்சி) மற்றவர்களைப் போல சாதாரணமாகச் செய்யலாம்.

ஹெர்னியா ஆபரேசன் செய்தபிறகு என்ன செய்ய வேண்டும்?

சாதாரண முறையில் அறுவைசிகிச்சை செய்து கொண்டால்

1. இரண்டு வாரங்கள் வரை கடுமையான வேலைகள் செய்யக்கூடாது.
2. நீண்ட பயணம் தவிர்க்க வேண்டும்.
3. இருமல் மற்றும் காய்ச்சல் வராமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

ஹெர்னியா வராமல் தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

1. மலச்சிக்கலை தவிர்த்தல்
2. நீண்ட நாள் இருமலுக்கு தகுந்த சிகிச்சை எடுத்தல்
3. சிறுநீர் பாதை அடைப்பு வராதவாறு பார்த்துக் கொள்ளுதல்
4. அதிக எடையுள்ள பொருள்களை தூக்குவதைத் தவிர்த்தல்
5. உடல்பருமன் அடையாமல் பாத்துக்கொள்ளுதல்
6. புகைப்பிடித்தல் மற்றும் மதுப்பழக்கத்தை விட்டு விடுதல்.

வாழ்க வளமுடன்

ஹெர்னியா உள்ள இடத்தில் வீக்கத்துடன் வலியும் உண்டாகும். சில நேரங்களில் வெளியே வந்த குடல் மீண்டும் வயிற்றுக்குள் திரும்பாது. இதனை Irreducible Hernia என்கிறோம். ஒரு சிலருக்கு வெளியே வந்த குடல் அடைத்துக் கொள்ளும். இதனை Ob-structured hernia என்கிறோம். மேலும் ஒரு சிலருக்கு அடைப்பட்டக் குடல் அழுகிப் போகும். இவை மூன்றுமே ஆபத்தானவை. இவைகளுக்கு உடனடியாக அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும்.

லேப்ராஸ்கோப்பி முறையில் ஹெர்னியா எவ்வாறு சரிசெய்யப்படுகிறது?

சிறுதுளைகள் மூலம் லேப்ராஸ்கோப்பி கருவியை வயிற்றுப்பகுதியில் செலுத்தி, குடலிறக்கப்பகுதியில் உள்ள குடலை வயிற்றுக்குள் தள்ளி, அந்த இடத்தில் Mesh வைத்து சரிசெய்யப்படுகிறது. இதன் மூலம் நார் போன்ற திசுக்கள் அந்த வலையோடு சேர்ந்து கெட்டியான சுவராக உருவாகி, தளர்ந்து போன வயிற்றுச்சுமை பலப் படுத்திவிடும். இதனால் மீண்டும் ஹெர்னியா வர வாய்ப்பில்லை.

வயிற்றுக்குள் Mesh வைப்பதால் எந்த பாதிப்புகளும் வராது?

வயிற்றுக்குள் Sterlized Mesh ஐ வைப்பதால் எந்த பாதிப்பும் வராது. Inguinal Hernia-வுக்கு Prolene Mesh பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் Incisional Hernia மற்றும் Umbilical Hernia -வுக்கு Bilayered Mesh பயன்படுத்தப்படுகிறது. (Proceed/ Paritex) இதில் உள்ள ஒரு லேயர் (Layer) குடலோ அல்லது கொழுப்போ ஒட்டாதவாறு பாதுகாக்கப்படுகிறது. மற்றொரு லேயர் (Layer) வயிற்றுத் தசையை மேலும் வலிமையாக்குகிறது.

லேப்ராஸ்கோப்பி முறையில் செய்தால் என்ன நன்மைகள்?

லேப்ராஸ்கோப்பி முறையில் செய்தால் வலி அதிகம் இருக்காது. சிறு தழும்புதான்

மேலும் விபரங்களுக்கு



177/3, M.T.H. Road, Villivakkam, Chennai - 49.
Ph : 044-26180099, 044-43577755,
Fax : 044-43577755

For Appointments : 8754590908

Web : www.chennaigastro.com
www.chennaigastroenterlogist.com

e-mail : dr@chennaigastro.com
lifecaredkjhospital@gmail.com